



## ROSECARE 3 RTU

REG. NO. L 7599 / N-AR 0726

ACT NO. 36 OF 1947

A READY TO USE INSECTICIDE PLUS SYSTEMIC FUNGICIDE FORMULATION FOR THE CONTROL OF INSECTS AND FUNGUS DISEASES AS INDICATED ON ROSES AND OTHER ORNAMENTALS

'N GEREED VIR GEBRUIK INSEKDODER PLUS 'N SISTEMIESE SWAMDODER VIR DIE BEHEER VAN INSEKTE EN SWAMSIKTES SOOS AANGEDUI OP ROSE EN ANDER SIERPLANTE

IRAC INSECTICIDE GROUP CODE	3	IRAC INSEKDODER GROEP KODE
FRAC FUNGICIDE GROUP CODE	3	FRAC SWAMDODER GROEP KODE

### Active Ingredients / Aktiewe Bestanddele

Bifenthrin(synthetic pyrethroid)..... 0.02 g/l ..... Bifentrin(sintetiese piretroied)  
Myclobutanil(triazole) ..... 0.075 g/l .....Miklobutaniel(triasool)

### NET VOLUME / NETTO VOLUME

#### REGISTRATION HOLDER / REGISTRASIEHOUER

AGRO-SERVE (Pty) Ltd trading as EFEKTO

REG. NO. / REG. NR.

1973/000868/07

Registered and Distributed by / Geregistreer en Versprei deur:  
Agro-Serve (Pty) Ld trading as EFEKTO™ Reg. No. 1973/000868/07  
Private Bag X 215, Bryanston, 2021  
EFEKTO and the EFEKTO logo are trademarks of Agro-Serve (Pty) Ltd.  
© Agro-Serve (Pty) Ltd. All rights reserved.

CUSTOMER CARE / KLIËNTEDIENS: Tel: 0861 EFEKTO  
customercare@efekto.co.za / www.efekto.co.za

MANUFACTURED BY/ VERVAARDIG DEUR

THE SCOTTS COMPANY

BATCH NUMBER / LOTNOMMER

DATE MANUFACTURED / DATUM VERVAARDIG

UN NUMBER:



**CAUTION  
VERSIGTIG**



### **GEREED VIR GEBRUIK**

Beskerm rose en ander sierplante teen Poeieragtige skimmel, Swartvlek, Bruinroes, Plantluise  
Blaaspootjies en Rooispinmyt.

**Rosecare 3 RTU** bevat 'n sistemiese swamdoder om genoemde siektes te voorkom **en** te beheer en 'n insekdoder om plantluise, blaaspootjies en roospinmyt effektief te beheer.

### **WAARSKUWINGS**

- Moet nie toedien op eetbare gewasse nie.
- Skadelik indien deur die vel geabsorbeer, ingesluk of ingeasem word.
- Giftig vir visse en ander waterorganismes
- Skadelik vir bye.
- Berg in 'n koel plek.
- Berg weg van voedsel en voer.
- Hou in oorspronklike houer, stewig toe, in 'n koel plek.
- Hou buite bereik van kinders, oningeligte persone en diere.

### **VOORSORGMAATREËLS**

- Dra rubberhandskoene tydens bespuiting.
- Vermyn oog- en velkontak .
- Voorkom inaseming van spuitnewel.
- Was met seep en water na gebruik.

- Spuit houer heeltemal leeg en gooi op 'n veilige plek weg.
- Vermy besoedeling van voedsel, voer, drinkwater en eetgerei.
- Vermy wegdrywing van spuitmis na eetbare gewasse en visdammetjies.

## **READY TO USE**

Protects roses and other ornamentals against Powdery mildew, Blackspot, Rust, Aphids, Thrips and Redspidermites.

**Rosecare 3 RTU** contains a systemic fungicide to prevent **and** control diseases mentioned and an insecticide which controls aphids, thrips and redspidermites effectively.

## **WARNINGS**

- Do not apply to edible crops.
- Harmful when absorbed through the skin, swallowed or inhaled.
- Toxic to fish and other aquatic organisms
- Harmful to bees.
- Store in a cool place.
- Store away from food and feed.
- Keep in original container, tightly closed, in a safe place.
- Keep out of reach of children, uninformed persons and animals.

## **PRECAUTIONS**

- Wear rubber gloves when spraying.
- Avoid eye and skin contact with the concentrate.
- Do not breathe spray mist.
- Wash with soap and water after use.
- Empty container completely and dispose of safely.
- Avoid contamination of food, feed, drinking water and eating utensils.
- Avoid spray drift onto **edible** crops and fishponds.

## **GEBRUIKSAANWYSINGS**

## **GEBRUIK SLEGS SOOS AANGEDUI**

### **WANNEER :**

Spuit elke 7 - 10 dae solank insekte en siektes opgemerk word. Blaaspootjies, Rooispinmyt en Poeieragtige skimmel sal slegs effektief beheer word as 'n spuitprogram van minstens 3 opeenvolgende bespuitings gedoen word. As swartvlek die vorige seisoen teenwoordig was moet bespuitings alreeds begin word wanneer die botsels begin oopmaak.

LET WEL: Indien daar alreeds Blaaspootjies, Rooispinmyt of Poeieragtige skimmel teenwoordig is moet minstens 3 bespuitings WEEKLIKS gedoen word.

### **HOE :**

- SKUD GOED VOOR GEBRUIK.
- Stel die spuitkop op 'n medium tot fyn druppelgrootte.
- Hou die spuit op 'n arm lengte en spuit die plante deeglik nat.
- Spuit die bo- en onderkante van die blare tot net voor afloop.

## **DIRECTIONS FOR USE**

## **USE ONLY AS DIRECTED**

### **WHEN :**

Spray every 7 - 10 days as long as insects or diseases are noticed. Thrips, Redspidermite and Powdery mildew will only be controlled effectively if a spray programme of at least 3 successive sprays are done. When rose plants were infested with blackspot during the previous season, spraying should commence as soon as buds start to burst.

**IMPORTANT:** If Thrips, Redspidermites or Powdery mildew are already present at least 3 applications should be done at WEEKLY intervals.

### **HOW :**

- SHAKE WELL BEFORE USE.
- Set the sprayer nozzle to a medium to fine droplet size.
- Hold at an arms length and spray plants thoroughly.
- Cover the upper- and undersides of the leaves to the point of run-off.